庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十六

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘 校對官典簿臣劉景岳 總校官庶吉士臣何思鉤

腾銀監生臣沈廷棟

ここのフリーンニー 懸飲者由臟腑虚冷禁衛 附論 冷雨肠虚脹欲睡引肠 不和三焦痞悶因飲水 周王朱橚 撰

桂心散 多足匹库全書 前胡散出力 去浑每於食前温服 右為散每服四錢以水 桂心 枳殼 出聖 出聖 息方 茯有 啊 黄雨去数 遍雨 苓芍 去湯 治懸飲腹脇痞急宿食不化心胃滿問 治懸飲心腹痞滿水走腸肋兩脇引痛 模炒 旋覆花料 滑 洗 卷一百六十六 盛入生薑半分煎至六分 桔梗半雨 白术四半 前胡雀頭去 附子 去半 皮两 臍炮 去 梨 赤茯苓 細平 朾

ここうし これ 厚朴散!! 石為散每服五錢以水 分去滓稍熟服日三四服 桂心科 前胡 **才盖汁炙令香熟卜去麤皮一兩途** / 進雨去 蘆兩去 改黄去镍炒 治懸飲心腹氣滯兩脇多疼 訶梨勒皮兩白木 一兩塗生 過去滑 一兩洗 黄分 去 起 大盛入生薑半分煎至五 甘草似 t 川大黄平做黄 赤剉 分炙 檳榔 檳榔

銀定四库全書 旋覆花方 日三四服 右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓温服 石為末煉蜜和九如桐子每於食前生薑湯下二 去做 狼黄 皮去 出聖 杏仁 皂角三枝去黑皮塗 川大黄一两野 治懸飲腹滿脇痛 雙仁數炒做黃一兩湯浸去度失 草豆蔻

治懸飲心腹氣滿兩肠多痛自 こ・ラシーニ 判痛嘔逆痰水不思飲食 石為末以酒煮麴糊為允如梧桐子大每於食前以 王薑湯下二十九 皂角 出聖 息方 造勉法 **尚本** 三兩楊 三雨去 廾 治胃不和宿寒留飲心腹痞滿脇 搗 莴盐出青 普濟方 為木 塗酥足令貨 汁 去浑颜成 旋覆花 **卡将半夏未以** 焦去子皮捣碎 胁

舒定匹库全書 治懸飲腹滿肠痛出生 生薑湯下 右為細末麪糊為九如梧桐子大每服三十九食後 石為末以酒煮髮糊和九如桐子大食前生薑湯下 草豆蔻二两 郁李仁三成湯洗 定去 枳殼四兩炒 乾薑二兩 半夏三兩湯白木三 適雨 去湯 滑洗 赤茯苓

飲謂因大渴而暴飲此 之間故言溢飲令人身體疼重而多江 ブルード 出聖 息す 溢飲附論 音番を 做二 炒雨 **氣溢於腹胃之外**

卸定四库全書 夏散 炙钱去 頂 颋 桔梗三分去 积段二分起炒 方 散每服五錢以水一盞生薑半分煎至五分 七遍去清 治溢飲胸膈痰壅頭痛嘔逆不下飲食 卷一百六十六 對 麥門冬云心批把葉 赤茯苓二 甘草與赤判防風去 白术分 前胡二

方息方 治溢飲在貿間不散上衝攻於頭面不能食飲宜服 出聖 浑不計時候温服 石為散每服五錢以水 7 前胡雀丽 白术 附子 皮 **皮兩** 臍炮 製 去 トトト 遍雨去湯 大盛入生薑半分煎至 **集湯** 焙浸 清洗 腹皮 對 半两 肉桂 此

欽定四庫金書 白术散出生 再服 石為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五 分去滓不計時候温服 分去滓不計時候熱服衣益取汗如人行十里未 桂心 白术 半夏三分湯洗 兩 治溢飲當發其汗 前 麻黄一雨去 胡盖頭去 卷一百六十六 甘草二分灸五味子二 赤芍樂二 旋復花

てい フリーンルラ 青龍湯出五 右㕮咀以水九升先煮麻黄減二升乃同諸樂煮 不出拘急痛 **升校去浑適寒温服一升温復今汗汗出多者温** 則 類 存方 難子大右仁皮失雙仁一枚如 杏仁四十枚去 桂心 治溢飲者當發其汗并身體疼重汗 治溢飲倚息不得卧及喘滿者見 皆野す 甘草义 兩 ***** 啊

多定四月全書 又方 惕肉瞤此為逆也忌海藻菘菜生葱 躁不得脈脉微弱汗出惡風不可服服之則厥逆筋 煎至五分去滓不計時候熱服衣益取汗如人行 右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 石膏 麻黄一雨去 服汗出者勿再服汗出多亡陽逆虚惡風煩 治溢飲當發其汗 桂心 杏仁 卷一百六十六 半兩湯洗去皮 雙仁炒做 甘草 赤两剉炙 細辛 雨半

てこうえ これ 治溢飲上衝頭旋目眩氣喘腹脇虚脹宜服此方 人心下築悸欬逆喘息飲食不下身體虚浮形如腫 里未汗即再服 石為末煉蜜為九如桐子上 **《停積貿膈不能消化支來於心故名支飲其狀** 旋覆花平 食附為 牵牛子做炒杏仁里们悉没去皮 計断な 大不拘時候生薑湯下 失

th. 多次四月全書 半夏九 焙去 殺去 白湯 和欺 焙泛 臼 方 秋牛 去 去滑焙乾 治支飲膈脘 夏 紅豆蔻科 附子 卷一百六十六 去足牌炮 不利咳嗽喘滿 製 白术 沉香 青 兩半 肉豆蔻 石肉

旋復花湯 こううし ハトラ 右為末與半夏膏和匀凢如梧桐子大每服十九空 温服不拘特候 心煎轧薑裹湯下加至十五九 右剉如麻豆大每服五錢水 旋復花雨 桑根白皮* 黄州炒 雨半 治支飲骨膈實痞呼吸短氣 甘草半两 軥 檳榔 茈胡 龍甲语網醋 盈半前至八分去 去一 桔梗 南


旋復花九 度 右吹咀以水五升煮取一升六合分四服以快下為 腫 甘草 東村 方聖 治腫及支飲滿辟 甘遂 漢防已 治支飲心胃壅滯喘息短氣皮膚如 卷一百六十六 **光**花 大黄 羌花. 黄芩 桂心

石為末煉蜜和九如桐子大每服食前以桑白皮湯 ううしい 桂心 檳榔 前胡崖頭、 **甜亭歷二兩隔紙** 礖 出聖 治支飲心膈痞急欬逆短氣不能下 檳榔 甜草歷炒令紫色 日本か 牛雨鼓微 两隔纸 穰 **遍**去 滑洗 前胡

舒定匹库全書 蜜脂丹 成飲或遇濕風流注謂之支飲手足或時少力指節 宜常服此樂 間疼屈伸不快或有痰飲甚則及於膝足或麻或弱 石為末煉蜜為九如梧桐子大每服於食前以温酒 下二十九 五重脂 細平 海出世經 方效 桂心 治因暑月飲水過多取凉熟睡停 卷一百六十六 兩 威靈仙 白茯苓

とこうらという 漢防已散出聖 治心膈間支飲水滿心下痞堅面黧黑色宜服此樂 候温服 石為散每服四錢以水 石為細末和勻以半夏末半兩水煮薄糊九如梧 頉 漢坊已 大每服二三十粒不拘時候生薑湯下 兩 前胡 石膏啊 治貿脇支飲數吐之不愈 崖頭去 鍾煎至六分去浑不計時 白术 桂心 雨 柯 蘆雨 桐 聖出

金分世四人 日三四服 右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓温服 漢防已內 息力 做黄去狼 炒做黄 赤茯苓 治支飲頭疼目眩心下痞悶 旋獲花 石膏 卷一 百六十六 啊 桂心 前胡 澤瀉 前胡虚頭去 蘆 両 云 啊 漢防已 白术



檳榔九 金万里屋八雪 木防巴湯 八方又桂枝 滿心下 生薑湯下 右為末薑汁煮髮糊和九如菜豆大每服五九食後 乙不愈者 乾薑地 檳榔半 痞問面色黧黑其脉沉緊得之数十日醫吐 治支飲胃膈痞悶 瘌 內豆蔻去椒半夏 卷一百六十六 **湯出**) 湯浸去 白焙 治膈間有支飮其人喘 白雨 焙湯 浸

茯苓五味子湯 て・ フ・・ こ・・ 實者三日復發發則復與服之若不愈去石膏加茯 苓四兩芒硝三合以水六升煮取二升去滓下硝令 右㕮咀以水六升煮取二升分為二服虚者服即 腹上衝貿四手足痺面熱豹然如醉因復下流陰 木防己西 一服做下利即愈又方不加茯苓 出三 桂心雨 治支飲手足冷多唾口燥氣促 愈

多定匹库全書 嘔者復加半夏二兩半以去 其飲飲去嘔則止其 當逐渴及止者為支飲也又飲發常冒冒然者必嘔 心服服之衝氣即低及更咳滿去桂心加細辛咳滿 右為剉散每服四大錢水一盤半煎至七分去浑空 股小便難時復眩冒嘔唾 止而復渴衝氣更發者以細辛乾薑為熱樂此法不 茯苓四 桂心雨 卷一百六十六 甘草二两 五味子

與此方 来湯出勉 黄三兩須詳證加減 形腫與痺加杏仁二兩半岩如醉胃中熱上薰加太 石大戟甘遂芫花捣為末以水一升五合煮東取 合去淬内樂未强者一錢贏者半錢頓服之平旦 百日或 大東 枚十 歲及懸飲咳嗽痛引即脇其脉弦者 **夫有支飲家咳煩胷中痛者不卒死雖** 大戟 トトラ 甘遂 光花る

多定四库全書 青金丸 厚朴大黄湯一名小承氣 而不下者明旦更加樂半錢下後自然補養而引脇 **後温生薑湯下** 右合細研匀滴水和九如梧桐子大每服二十九食 血此坐久飲過度所致也其脉虚者心冒其宵中本 下痛者亦十粟湯主之 硫黄料 治支飲不消喘嗽不止 水銀半 卷一百六十六 治傷湎酒嗽咳者必致吐 半夏湯為去 滑石斗 啊

とこうしん 化氟九 放乾以麩二升於銚内慢火拌樂九同炒麩黄為度 **超并巴豆粉用黄連水和硬軟得所九如梧桐子太** 右㕮咀以水五升煮取二升分作二 石光将黄連搗末以水半升煎十餘沸隔 有支飲胷滿治之之方 巴豆五十枚 治支飲痞膈食運化 去皮心 大黄麻 粉 枳實和 黄連去 去年 杨 服温服之 5 白髮 宿取白 柯

夢 歷九 多分四月月 香九 右為末生薑自然汁煮麪糊為九如梧桐子大每服 控轧每服三九或二九食後臨睡熱酒或水下 以羅子篩去麩取樂再於黃連水內略漉過竹器內 一十九薑湯下不計時服 木香雨 甘学歷少 木香雨 治支飲氣喘不得息 治支飲下氣 牵牛子炒過黄 半夏一雨湯洗七

小半夏加茯苓湯一名大半夏 て、ファント 右切以水七升煮取一升五合再服忌牛肉錫大胡 右為未煉蜜為九如桐子大每服五九食後薑湯 也先渴却嘔此為水停心下卒嘔吐心下痞膈間有 本渴心下有支飲故也小半夏湯主之加茯苓者是 水白脏悸寒痰 皮酥灵 4 事事を 治嘔家渴者為飲組

卸た四庫全書 治支飲不瘥大腹水腫喘促不止宜服此方 治支飲喘息短氣身體腫宜服此樂 時温服 右為散每服四錢以水一中盛煎至六分去滓不計 廿草 **洽不用茯苓用桂心四兩有寒痰臨卧温服熱痰如** 分脾胃不和去甘草入橘皮一分 炒个針醋 拌 白水 卷一百六十六 漢防己 甘遂 出聖 息方 **黄分** 煤

神應力 **てこうシートラ** 石味同炒存 石為散每服於空心濃煎車 槐花牛 九食後温水下 炒 出金 匮方 治支飲胃膈痞悶飲食遲化 療心下有支飲其人若胃善眩 巴豆皮捣碎 分性為支 6髮糊和丸如菜豆大每 **聚湯調下以利為座** ŧο

多好四月至書 中夏湯出三 浑温服一方一日三二服服三日畢再服枳木九盡 右切以水二升煮取一升叉以一升煮取五合此五 **其痰為度論曰先消胷中氣後去膈上痰再服枳朮** 右為判散每服四大錢水二盤薑十片煎至七分去 合分為再服忌桃李崔肉等 凡者先後合盡消其氣乃令痰不復作也一方每服 半夏七次 治飲嘔吐不渴 卷一百六十六

治支飲久不應大腹水腫喘促不止为見廉直門 氣來之則今脇肋堅脹按之水聲有時而痛妨害食飲 久不治令人羸瘦故致痰癖也 こうしてい 疾癖之病由三焦氣不升降水飲停滯流於脇下寒 苓各半錢 滓温服若腹鳴有水聲每服中加去穰橘皮去皮茯 痰癖附論 錢水一盛半生薑秤半錢切片同煎至一 肺 盛去 類

金江四月全書 者 王不留行二 **皮製** 臍去 鳥頭二兩半 光花雕炒 桔梗 方 治一切風疼痰飲坚癖痎瘧等疾久療! 二雨 雨 枯羹二两 炮 天雄果去 皮臍 卷一百六十六 二两 差花上雨 曼荆實二兩半 五加皮 紫花去土 半两附子 白木 啊 酌

炒 兩去內從劳 兩 一 分雨 細辛 笛子 二两 酒一 浸雨 切去 羅兩 宿雨 阳 門 酒 浸 焙 浸 浸 浸 白芷 焙苗 兩 根形根三 分兩 狗脊 分

多江四月至是 獨活五差 續斷 乾薑 **具菜更三分湯** 黄芩三分去五味子 亦茯苓三分 剉 通 分三 ち樂か 去 牡丹皮 食养笋 三分去 诒 胪 陳橘皮 蜀椒 栢子仁 桂维皮 胡二 去白焙洗 苗分 去 炒去 黄耆細 菖蒲 防己 山茱萸 E 去 志 汁 用閉 心分 判分

旋復花九 たこうをとう 右為散每服三錢温湯調下 聚流移於脇肋之間時而痛則謂之痰癖 胷腑之間遇寒熱之氣相摶沉滯而成痰也疾之 頭眩欲倒脇下痛病源云痰癖者由引水未散在於 不能下食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利或 赤或黄腹中有時水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起 旋復花 療右肋下停痰癖飲結在兩脇脹滿羸瘦 普濟方

金公巴尼八雪 右為末內否仁葶歷子脂碎研調節度蜜和為九如 増以徴利為度禁食豬肉魚蒜生葱酢病既在 梧桐子大每服於食後少時且飲服三九日三服稍 有癖氣水飲結聚不散數發則間剌心痛又未曾 防葵 杏仁 皮 桂心 搗 皮 如失 藥 脂 一 百六十六 皂角 乾薑~ 夢歷子常色別 蜀椒 皮子炙 附子炮一两去 附子一 分款令 枳實之 乾地黄 搗 脇 去雨

こうしょい 旋腹花儿 肉無美 積 聚更急飲食減少此方正與癖 氣相當更有三兩 食食不消化唾乾嘔大小便或澀或利或赤或白腹 烏頭此並破癖疾不停不用復聽臨時不如服鳥頭 如此破癖飲樂雖服補樂癖氣不降終是不損恐久 凡癖氣得減亦未必煩服旋復花九忌酢物生葱豬 毒藥今商量除記其方內有附子別本續命九有 一出聖 方 治痰癖飲結兩脇滿脹羸瘦不能飲 Ŧ

痛 旋復花 附 剉 有熱唇口乾 梨 桂心 去赴粮炒 起頭眩欲倒腸 防葵 甜亭歷 去篷

こっ フシート 五飲丸 右除巴豆外以水一 石為末 青皮 每服以粥飲下二十九日三四服 搗生 烏梅肉 治痰癖脇痛水飲不消 歴膏煉蜜和搗三二百杵九如梧桐子 五靈脂和 光花 科 斗同煮水盡焙乾搗羅為末別 去半油雨 甘遂 京三 苦亭歷雨 足尖雙仁炒两湯浸去 一两 酸石榴 醋 Ė

多定四库全書 破飲九十二 脹滿氣促胷腹結為癥癖支膈貿脇傍攻兩肋搶心 研巴豆拌匀酸麪糊為九如菜豆大每服 **聚樂乾嚥下食後服** 疼痛飲食不下翻胃吐逆九種心痛積年宿食不消 又瘧久痢遁尸疰忤顛癎厥暈心氣不足憂愁思慮 因方 諸疾悉能治療久服尤妙且不傷臟氣 治五飲停蓄貿脇呼吸之間痛引兩脇 卷一百六十六 胡椒 縮砂仁 九嚼東

ころうとこれう 万津液送下 頭風服之亦効且斷根不發或其頭風即痰飲耶 匀九如策豆大每服五七九臨卧薑湯下曽有婦 出巴丘水淹烏梅肉蒸 右以青皮同巴豆水浸一 木香木見 出聖 各等分类 治痰癖心腹氣滯攻於脇肋疼痛 蝎稍 宿次日漉出同炒青皮焦 炊久細研為膏入未樂和 烏梅 青皮

多定四月至書 去浑不拘恃温服 右為散每服四錢以水 肉桂 檳榔 Ħ 不見火 次分 去湯 治癖飲氣分心下堅硬如杯水飲不 皮 滑洗 鼈甲 雨塗 中蓋入生薑半分煎六分 附子士皮臍 福酥 廿草() 榈 炙 做三 令 黄去数块 赤约白术 前胡 去一 蘆雨

ララーニー 浑温服不拘時 石吹咀每服四錢水 鼈甲人 檳榔 海心腹兼冷方 成後 去一土两洗 甘草气 白水 柴胡 事断を 盤半生薑七片煎至七分 白术 分去莲 檳榔煮湯 Ŧ á

枳殼九 銀定四库全書 荆蓬煎九昳危 服 右捣羅為未煉蜜和九如梧桐子大每服十九至十 右切以水六升煮七味取二升半去浑内檳榔 五九食後生薑湯送下 石斛 枳般半四数人参 《合當利忌海藻松菜莧来桃李雀肉等 治痰癖脇肋刺痛匀氣寬膈 治破痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈痞 **訶梨勒皮分甘草人** 整一百六十六 五味子內 此胡 苗两

利膈九 こうし ここ 湯下 問通和三焦升降陰陽順氣消化宿食 石為末麪糊和九如菜豆大每服三十九食後生薑 军中子做炒 皂角皮酥炙白磐 拉用 於銀石絕內去皮巴豆二 治痰癖胃膈不快 夏雨 酒浸 A Ξ 計画が 狼去 檳榔 逢我术夏四 '一兩 白去 剉 一兩酒 八次 甘草 Ē 川茴香

茯苓散 : 石為末生薑自然汁和九如梧桐子 附子 當歸 十五九 母服五錢以水大盤 皮兩 雨判半夏 梨 白术 治疾癖育中臍下强滿區逆不思於 啊 涉洗 盡生量半分前至五 大食後荆芥湯 啊 云白狼焙 鉛白霜 桂心

消痰九 利貿膈 温熟水下或薑米湯下亦得 石為末炊餅為九和如梧桐子 <u>;</u> 白去 治痰癖肠下鞕痛嘔吐 **小計時候温服** 草豆蔻 治頭目不利痰逆惡心升降氣道寬 切烙乾薑儿 去皮檳榔一兩 大每服五十九食 柯 柯 青橘皮 Ē

皂炭檳榔九 右同研匀煮麪糊為九如梧桐子大食後温水下 取轉積滯者七九至十九欲微利者五九 兩剌二 月迪分 皮子 判去 治痰癖咽嗌不利及大腸澀滯嗽 脈粉 冷戾 柯 杏 粉霜 ソス 温出 兘 池 去皮

こうし ここ 消飲白水九出柳樂 卧生薑湯下 右研匀煉蜜為凢如梧桐子大每服一九至二九 臨 吐目視脏脏耳 右為末煉蜜為九如梧桐子大每服三十九温米湯 檳榔牛 白术 炒去粮匙 **判**半 傷雨 半夏三兩湯洗 ,腸中有聲 治痰飲癖酒停痰積聚下 乾薑地 Ē 瘌

多定四库全書 冷水卒起頭眩欲倒脇下疼痛 治痰飲兩脇滿脹羸瘦不能飲食食不消化喜唾乾嘔 小便或澀或利或亦或白腹內有熱唇口乾焦好飲 右為末研入前研過巴頭令匀煉蜜和九如小豆大 下食前服 每服以粉飲下二九日二服以利為度 巴豆大枚 皂角之化黄白 去皮心研 杏仁火雙仁数炒 皮

石為未研入後二 出聖 月母 俱出聖 惠方 煉蜜和九如梧桐子 心郁 崖明雨去 细泥 研内

授門中多疾頭痛不欲食及飲酒則瘀阻作 人方 日三服 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服以粥飲下五九 九日三服 旋復花 狼 啊 卷一百六十六 Ł 松雞 附子 **去皮臍** 梨 胡冷各

欠こりをしまう 治痰癣氣不消不思飲食宜服此方 療育中多痰頭痛不欲食及飲酒則於阻痰方 服盡 右攀石一 右切以水酒一 服不吐晚更 石件㕮咀以酒二盏煎至一盘去浑分為三服 具来 美迪哈 乾 微炒 雨以水二升煮取一 服 普洛す 合漬之再宿去滓温分再服 硝石 升内蜜半合頓服之 息方 出 聖 生薑切 文 利騙洛 EJ

金分四月五十 治疾癖氣不散不思飲食新一名董附 治痰癖飲結兩腸滿脹羸瘦不能飲食食不消化喜唾 須臾未吐飲少熱湯 满分見 本門留 乾嘔大小便或澀或利或赤或白腹内有熱唇口乾 焦好飲冷水卒起頭眩欲倒肠下疼痛が見本門 良畫九高 治痰癖醋心吐沫飲食不消氣逆 卷一 百六十六 湯痰

たこううこう 治痰冷不消結成癖塊腹脇脹痛 瓜帶散此熱 右切以水五升煮取二升半 芫花 炒 粒 夏汽雨 服忌豬年肉湯 **今兩 轧**醋 治宿飲結實及痰癖實內風疾 拌 癖噫氣吞酸 普濟す 兩 附子地 硝石料 去滓温分三服老小 枚 芜 類氣 F

枳朮湯貴九 金分四母全書 作名曰氣分 右切以水一 忌桃李崔肉等物一方為末炊餅為九如桐子大每 石為末生薑汁和九如菜豆大每服空心温酒下 枳實之枚 去滑 枳 斗煮取三升三分服腹中輕即散神 白水雨三 療心下堅大如盤邊如旋盤水飲所 百六十六

旋復花九 服五十九水飲) 旋復花 細平 赤茯 治飲癖心下堅大如 崖頔 嘔大小便澀 冶痰冷 分去 乾 桂 ت 曽断す 祵 分 結聚腹脇脹滿羸瘦不能飲 犑 炮 剉 黄去梭炒 三分 贬 犑 Ī 光花 白木 臍 阁 飲見 裂 類 本 醋 pg [

厚朴散 彭定匹库全書 不下飲食 右為末煉蜜和搗三二百杵九如桐子大每服食前 以生薑湯下十九二服以利為度 湯浸 厚朴 炙令香熟 具菜更选焙乾微炒皮塗生 薑汁 具菜更半雨湯浸七 治痰冷癖飲腹脇虚胀常吐酸水時復嘔逆 盖汁炙令看热三分去麤皮金 木香津 甜学歷炒令紫色 生 甘遂半雨煨 高良薑 厚朴 陳橘皮 桂心 龐雨

細辛 石為散每服五錢以水 フ・シー ことう 細辛 去浑不計時候稍熱服 去七清遍 治痰冷癖飲上氣喘滿四肢浮腫 啊 剉 · 啊 桂心 甘草 赤茯苓 計争を 去莲 分炙 去白狼焙 兩 判 大 盗 甜学歷 草豆蔻云皮半 生薑半分前至五 ヴ 白术 肠 訶梨勒皮 夏半两

光花九 多定四库全書 以粥飲下五九日二 右為未煉蜜九搗三二百杵如梧桐子大每服食前 赤茯苓 光花 半雨醋 杏仁里分湯浸去皮头 治痰冷癖飲腹中積聚成塊 拌 澤寫分三 光花炒今朝 一服以利為度 黄芩平 拌 白术 附子! 甘遂半雨煨 ***去皮臍** 甘遂果成 漢防已 桂心

硫黄丸 ブニ ニニ 腫 如梧桐子大每服空心以粥飲下三九亦食 硫黄二兩細礬石 治痰冷癖宵中 **尖雙仁別研** 一兩湯浸去。 人巴豆杏仁同研令匀煉 炒做黄腐 脢 没去皮 絥 7年做炒 兩黄 痰滿心腹堅痛不下飲食 氾 研 紙 晨壓 碎一 做雨 十枚去皮 乾薑! 剉 <u>+</u> 去 炒没 油 b 去 納心 製雨 研研

甘遂九 到定四月全書 肢浮腫 以温生薑湯下二十九 右為末煉蜜和搗三二百杵九如桐子大每於食前 甘遂一分恨 光花 桔梗一两去赤茯苓一 剉 治痰冷癖飲久不瘥腹肠脹滿不下飲食四 桂心 附子 柯 啊 拌 細草 桂心 白ボ 川鳥頭

桔梗丸 てっしてい こい 出二 右為末以杏仁研如膏與諸樂末拌令匀煉蜜和搗 三五百杵九如梧桐子大每服食前以粉飲下 月母 桔梗 青橘皮 甜草麼少黃色 服以利為度 三分去京三棱 治痰冷結聚成癖兩肠脹痛 做黄 烏喙去皮臍一兩煨烏喙三分炮 去白狼焙一雨涉洗 紙 善断か 一兩微 梨 做炒川芒硝 碎一做两 剉 ţij 去苗

剑灰四库全書 檳榔九 每服空心以生薑湯下三九 石為末研入巴豆令匀以酒煮髮糊和九如菜豆大 起炒做黄 去 皮头双仁 桂心平 檳榔 炒做 治飲癖心腹脹滿不能下食 乾薑米两炮 防風 雨 光花少三 白术 轧酯 當歸 桂心 拌 桃

てこう.とここと **畺湯下二十九** 白术 頣 治痰冷癖飲胸膈滿悶不能下食 三分去 桂心红 皆科が 七次分去湯 **丸如梧桐子 皮雨** 磨炮 去数块炒 清洗 収 甘笪 兩塗 1 福醋 櫊

細辛 剑灰四库全書 右為散每服三錢以水 去浑不計時温服 拘時稍執服 石為散每服五錢以水 細辛 赤茯苓 皮 治飲癖習中結滯 白水 七次去清一兩湯浸 一中盛入生薑半分煎六分 大盤入生薑半分去浑不 啊 當歸 推涉 下滿急嘔逆不能 焙 洗 州附子 桂心 拘 牧网

· · · 附子湯 郁李仁九 处去 炒火 郁学 十五九 療心氣分心下堅如盤邊旋 煉蜜和九如梧桐子大每服於食前以生薑 做尖 雙 治飲 货 頣 皮两 仁 去 去湯 做涉 消浸 炒浸 腹脇脹滿心胃不利少思飲食 黄分去处 狼炒 川鳥頭 旋復花 去皮尖脐一向煨裂 桃仁 檳榔 浸雨

銀定匹庫全書 呉茱萸九 論名桂去芍藥加麻黄細平附子 神驗忌海藻菘菜猪肉生葱冷水生菜等仲景傷 煮取二升去浑分服七合當汗出如蟲行皮中即 右細切以水七升先煮麻黄再沸掠去沫乃下諸樂 此湯主之 桂心西 細辛 治飲癖胃膈不利吃食經日吐出不消 大附子地 生薑和 卷一百六十六 枚 麻黄三雨 大東 * 甘草二

とこうシーン・ 香散 **腔痛身體手足指甲盡黄支滿引肠下痛** 右為末煉蜜和搗五七百杵九如桐子 湯下二十九日三四服 防葵 治痰冷癖飲停積不消在於智中 **大培乾做炒** 白ボ 特有頭目

多次四月五十 涉下七九日二服 石為細末以醋煮髮糊為九如菜豆大每服以生薑 石為散每於空心前濃果湯調下一 半夏二兩为治熟 山狼毒二两細 木香 治痰冷不消結成癖塊腹肠脹痛 檳榔 酌 抖 光花 附子去皮肤 少令乾料 一錢以利為度 炒羊做雨 贵剉

桂心散 こううしいか 煎至五分去滓温服日三四服 桂心分 附子去皮臍製 令兩 乾醋 抖 白ボ 替濟方 次丙去 清洗 食 八盛入生薑半 細辛 耐

中軍候黑九 多分四月至言 為驗空心粥飲下忌豬肉蘆笋生葱等 右捣筛蜜和九豆大每服三九日 生薑湯下十九 右為末醋煮麪糊為九如梧桐子大每服於食前以 杏仁五分去皮 豆皮 黄金 心研光花炒三两 療癖飲停結悶滿日間 卷一百六十六 桂心如 稍增得快 桔梗

甘遂九 とこうシート 増 不消化喜唾乾嘔大小便或澀或刺 旋復花分 乾薑沙 椒目 治停痰癖飲結在兩腸腹滿羸瘦 療久 **蜜和九如桐子大服三九米飲下日三服後漸** ~癖留水 桂心 黄 普合す 枳實 光花 附子 不能飲食食 狼毒 王 細平 B

金好四月至書 服二九日三服不知稍加以意将息之大加奪大水 右搗篩其巴豆杏仁搗如膏合以蜜和九如豆大毎 飲病忌食蘆笋豬肉生葱等物 光花り 桂心 古參 令三 拆分 炮 杏仁松研 甘遂 大戟 芒硝 亭歷子私 氣心痛 百節俱腫者 皮+ 研枚 去 月母 黄

とってえこれ 消飲九出五直 石大黄搗木外四味別搗如膏入蜜少許和更搗 之忌如常法 -杵以米飲下一九如麻子稍加至三二九以意量 令皮 孰尖 炒 **T脱下急痛腹中** 治酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗 **亭歷子** 巴豆皮心研去 苓三皮雨 音音方 水聲目眩旋量小便不利 政府 乾薑地兩 杏仁牧士 芫 白水

多江四月全書 斷膈湯出す 阻 减之 不拘時候 石為末以水酒各一 石為末煉蜜和 恒山 **得快吐後服牢夏湯** 事親門出偶門 治胷中 甘草 **计半煮取一升半分三服後** 柯 痰癖頭暈不欲食及飲酒則症 大每服五十九温米飲 南

たこういれんかっ! 太し九 心服 石為細末每服一二錢量虛實加減以釐汁調下空 苦夢歷典門豆油心膜 末以生 薑自然汁 治痰癖不可解者 滑石雨! 南星 普濟す 大花粉 川号 糊為九如難頭子 硃砂 7 五靈脂

除飲九出街生 金分口及人 及中酒人服之 砂為衣每服三九先嚼胡桃半箇次用薑汁吞 天南星四 閲 赤茯苓 冷黄 色用紙 青皮 بع 治一切久積痰癖停飲常服永無患 包定安 去粮处炒四两汤浸 **建去白**四两湯 髙良 去雨白湯 慢以 縮砂 轧自 兩

とこうら こう 蒲四兩遠智去心二兩若夜不得眼夢泄白濁加酸 糊為九內不得着水九如桐子大每服五七十九生 **棗仁龍骨各二兩仍用硃砂為衣以麥門冬湯送** 右為細末用神麴半斤麥蘖半斤以生薑自然汁煮 薑湯送下不拘時候若患心脾病怔忪驚悸加石莒 白稨豆] 出 街 生方 人腹皮鱼灰 破痰癖消癃塊及冷熱積 普濟方 判三棱 兩細判 宿

動定四月至書 消痰破癖 治痰癖以薑附湯主之 服 右為細末醋煮髮糊為九如梧桐子大用硃砂為衣 每服二十九炒生薑鹽湯下温酒亦得食遠日進三 以蒲蓟酒飲之 青皮 廣茂二兩 細 草出 去一白雨 且三十枚同炒豆黄则酒浸将三稜同廣 茴香 炒二两 炒豆 黄色 茂用

其候也 たこりをとう 留飲之病得於! 以白楊樹皮酒漬服之 留飲 出聖 出本 息方 草方 /間令人 附論 治留飲 , 痞滿短氣脇下脹痛喜渴數飲是 |焦壅痞氣脉凝澀致水飲不消留 普濟方 消心腹堅痛胃滿嘔逆

金万口とろい 腹中積聚 撥煮散 右搗篩每服三錢以水一盞半入生薑半分煎七分 云淖不計府候以微利為度温服 檳榔 木香兩 郁李仁 判 ·泛去皮为 治留飲食癖 兩 丁香料 卷一 百六十六 白术两 桂 訶梨勒皮科 乾薑料 龘一 虔雨 去 穕 甘草 澤鴻 **炙一** 剉雨

快膈散 てこりをという **或飲食後或早起口吐清水** 石為廳末每服五錢以水一盥半入 白术炒 甘草两 訶子地 定去 分去滓温服 治胃脘停痰膈中留飲心頭不快復時六 一两 地二次 光 普濟方 一线 去白狼焙)一雨涉浸 桂三分去 香附子二獎草 (生薑五片煎取 甘草 白木 聖 草豆蔻 半雨 兩車 兩

金万四四八十二 赤茯苓湯 服 右捣筛每服五錢水一盞半生薑半分煎至一盞去 石為末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎七分熟 去滑 赤茯苓黑皮 治膈間留飲嘔逆頭眩短氣多渴 杏仁皮炎 去 白术 百六十六 檳榔一西 茈胡 去一 苗雨 旋復花 枳殼

次香茯苓丸 **픨湯下** うシント 沈香 **处去** 甘草 不計時候温服 上半用两 院出 御 治留飲滿脾胃利胃膈調順氣血 肉豆榖 普酒方 七次去清 治痰涎留 白焙 兩湯浸 丁香 入每服十五九食前生 檳榔 野 白茯苓 散心腹 痞 兩半 啊

多次四月至 悶飲食運化或時欬嗽胸膈不利並宜服之此藥化痰 亦可 石同研為細末生薑汁煮麪棚九如梧桐子 一歌消尅飲食 天南星地雨 雨為衣每服六七十九煎生薑湯下不拘時茶湯 香白芷和 皂角 去白雨 白礬 大硃砂

とこうころという 参白术九 可 石除研者外 每服十九至十五九食後温生薑湯下 飛錢 研 治利貿膈去痰逆不思飲食 搗羅為末和令勻煮東肉和九如梧 白水 丁香分 **水生蟲久則成及胃及** 半雨 龍腦 I 白茯苓 於清 方 桐

利膈九 金只四月至重 變胃癰 五七十九食前薑湯下 石為細末醋糊為九如亦丘大每服二三十九加 光花! 治留飲調正氣利心膈行壅滯 ,二两 抒醋 乾漆 檳榔 卷一百六十六 两半 去白焙浸 狼牙根平 巴豆 微十黑枚 が 桔梗

たこうらしいか 服二 石為細末煉蜜和劑再搗五七百下九如梧桐了 十九温生薑湯 兩 療腹中留飲 木防己 普濟方 二两 七遍焙 两涉浸 食後臨卧服 **亭歷子**教 入每服十 二两 異

快活九比的 順流紫九出十 多次巴西名言 歸 右為末蜜和九胡豆大平旦服一九加至二九胡洽 有黎蘆從容當歸各三分范主方無石膏半夏有當 桂心 石膏红 便不利小腹切痛膈氣上塞 分茯苓三分茯苓 代赭石分 巴豆 治心腹積聚兩肠脹滿留飲痰癖 治上膈停痰中脘氣痞不下飲食 去皮枚 百六十六 分熬蘆五分 烏賊骨二 半夏分

たこりられた 肢浮腫及人腹滿 停痰留滞貿膈痞悶不快或咳或嗽升水氣流注四 右為細末酒煮神麴末髮糊和九如梧桐子大每服 十五九至二十九生薑陳皮湯下不拘時候 或時嘔吐食不消化心腹脹滿大便不通 出鄉縣 去白 三雨不 陳皮三兩 治痰脾胃停飲攻注腹痞滯冷痛或 去白 不 吳茱萸 地雨木香

金以四月百十 椒目九 减服之若治腫滿及腹脹用葱白湯下 凡至二十九食後生薑湯下如溏利時相度虛實加 石将五味為細末用皂膏和九如桐子大每服五七 沉香 椒目 浸 生 治腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之 盏 Ł 热如 破故紙 摅 浶 柿 愯 移 秋 丰 大黄 两半 成 رج 更 郁李 大皂角

五膈九 甘遂半夏湯 とこう シーニー 稍増口中有津液者止渴者加芒硝半雨 右為細末蜜和九如梧桐子大先服一九日三 石為細末煉蜜和九如梧桐子大每服四五十九 乾焙 大黄 治留飲停積不消胃膈痞魚 治病者胸腹欲自到 牵牛和 皆掛す 木香 利當快雖利心 陳皮 一服後

枳實湯 多好四庫金書 續堅滿此為留飲未去故也 右以蜜半斤内二藥汁共得一升半煮取八合頓服 石龐搗篩每服三錢以水 分去滓温服日三服 **水煮取半升** 甘遂三枚 枳實に雨去白水 治留飲在心下堅痞時復作痛 **粮处炒** 与樂人 **)**', 雨三 盤入生薑半分煎至七 半夏二十 枚 桂 麤一 虔兩 去 甘草 指枝

廿遂湯 茯苓半夏湯 こううしいい 並宜服之一名我 惡心以致飲食不下並宜服之或膈悶有痰水眩悸 浑空心服 石為廳末每服四錢水一盞生薑七片煎至七分去 下續結滿為留飲未除 治留飲病脉伏其人欲自利利後即快雖 治停痰留飲貿膈滿悶咳嗽嘔吐氣短 F F 5 洗七次湯

多定匹库全書 半夏九 前胡散 夏湯 服虚人晚間服 石搗篩每服一錢水 甘遂 香隆度九門疾飲類 治留飲不散膈脫不利宿飲不消嘔逆惡心 治留飲不除胃中痰冷方見 治濕飲停留肢體時疼痛氣膈痰熱客於 八參末 贞 炒 錢蜜半匙頭更煎三兩沸空心温 生薑汁 大盛煎至七分去浑再 湯浸 抖 炒去 乾滑 類本 PI) 约

たいりしいか 有留飲漬積於胃受濕則飲食遲化或有酒後飲 浑取七分熱服日進三服 石為未每服三錢水一 前胡比錢 捷去 留飲宿食 七錢 **痞悶不欲飲食頭目眩昏** 陳皮 甘草科 普濟方 去半日雨 七錢 一盤半生薑七分煎至一盤去 赤茯苓 木香件 * 七段 半 枳炭半雨 五十

停留於肺胃之間脾得濕氣則不能消食令人 金月口人人 酸冷運惡心腹肠脹滿不思飲食皆其候也 金方 石膏五分 黄色 方 療心腹留飲宿食 丹参 戎鹽分 附子炮 卷一百六十六 分 古参西二 大黄分 之枚 桂心 噫氣

とこり。戸に 草豆寇散 生葱分儿 石為末散以白蜜和九如小菜豆大吞一九日再 乾薑地雨 白湯培 **先食服一九不知稍益以知為度忌豬肉錫蘆鋅** 去裙 草豆蔻 惘 治留飲宿食成癖 分附子五皮降五味子 白术神 普濟方 枳實裸处炒桂雞皮 鼈甲畔 陳橘皮 至 去

多分口月百十 鼈甲散 湯下 右為末散煉蜜和九如梧桐子大每服二十九戎鹽 右為散每服二錢温酒或生薑湯調下 涉没去 桂。 鼈甲 厚朴鹿皮 大黄料奶 焙 治留飲宿食成癖 皮 去裙 去 醋炙 櫊 京三稜 卷一 百六十六 更半两湯 乾薑學兩 附子 去皮牌炮 梨 木香畔

當歸湯 九寶丸 とこり見いか 海藻松菜 右切水五升煮取三升分三服空心食後服忌生葱 芒硝 當歸 治留飲宿食脹滿吞酸嘔逆 治留飲不消腹中積聚轉甚 內豆蔻二兩厚朴二 澤寫一 桂心的二 大黄四 甘草 生当

光花九 渉下 右搗研為末生薑汁和九如豌豆大每服七九桶皮 光花少 乳香 主留飲宿食 一柄 啊 Ŧ 大黄丸 **汁和作餅爆乾**一兩半為末生 文雙 仁研 甘遂 雨二 剉 畫 两 桂三及 去 とこうえしたう 白术散 豬肉冷物水笋等物 先食服一九日再不知稍増以知為度忌海藻菘菜 右捣篩杏仁巴豆別搗如膏令合以蜜九如小豆 赤茯苓平 白ボ 赤 附子 治育膈留飲腹中虚滿氣逆不下飲食 半两炮 南 去 皮臍 収 陳橘皮 桂心郎 計済方 去白 两 镍焙 湯浸 前胡 蘆 面 函 去 七遍去 滑洗 F 甘草 香料 做半 炙雨

金分四月至書 木通丸 煎五分去浑不計時候温服 石為末別搗葶歷杏仁如膏和諸樂末令煉蜜和搗 右為散每服五錢以水一大盤入生薑半分裹三枚 木通半两 上過去清 治留飲宿食寒熱煩滿 椒目 甜亭脏 杏仁 炒出汗附子半两做什子 兩湯浸去皮头 紫陽 色紙 去皮臍 黄 半雨去 龐 梨 川大黄 热塗 生

通草丸 てこり上へいかう 搗五千杵光如梧桐子大服二九忌豬羊肉餳 右為末別搗葶歷杏仁令如膏合諸樂末以蜜和勻 九 二二百杵九如梧桐子大每服食前以薑湯下二 椒目 芒硝 五 治積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足 附子地 骨済す 兩 華歷子点 杏仁 季里 厚朴气 雨

順流紫九 金万里是人 右為末搗篩白蜜和九如小豆大先食服一九日再 子五勞七傷婦人産後餘疾等 方中無通草未詳其名 肉酢物野豬肉蘆笋等物 不知增之欲下倍服之別搗巴丘三枚入之忌生葱豬 當歸分 療百病留飲宿食心下腹痛四肢煩疼男 代赭石 肉從容分 卷一百六十六 沙. 粮蘆山外 茯苓 桂心乳 烏賊魚骨

桂心丸 てこうらこと ニ 母服食前以温水下五九 石為末研巴丘令勻煉蜜搗三二百杵九為小 桂心科 萸 判 皮 治心腹留飲宿食不化腹脹氣悶疾逆頭痛 治留飲宿食不消止逆温胃 替濟方 遍去漫 做炒 炒水 研 8 附子

硇砂九 到分四月 百十 右為末用生薑汁煮麪糊為九如小豆大每服三十 九生薑棗湯下不拘時候 硇砂 出 丁香线 青橘皮 治留飲宿食不化腹肠氣痛不思飲食 洗錢 京三稜火 狼毒醋奶 焙 去 爆 一 百六十六 剉 * 光花醋炒 草豆蔻三及檳榔 木香錢 鼈甲 乾漆 剕 Ξ 枚

たこうらんはか 光 花 九 石為、末次 每服三九食後温酒生薑湯下 去棍 不與巴豆杏仁膏同研 治留飲食不化 **令**兩 乾 群 别研二 味再同研与超糊為九如菜豆 普滴す 一、美色培 去皮心研 油 青 皮 兩煨 附子 秃

多分口尼人可 石為未入巴丘令匀煉蜜和搗三二百杵九如小豆 每服食前以粉飲下二十九 入每服食前以粥飲下二九以利為度 川大黄平町 腹痛嘔噦惡心胃肠脹悶大便松不利 當歸 治留飲宿食心下腹痛四肢煩疼 治脾胃不和留飲宿食不消及累 两剉 赤茯苓二 タゲ 剉 做黄桂心雨处桂心 去皮心 壓去油

温胃散 ここりここここ 時滅九數 石為末與硇砂巴豆霜拌匀醋煮麪糊為九如菜豆 犬每服三九加至五九早晚食俊臨睡服大便溏 巴豆霜 木香页 治留飲順氣消宿食 兩為 錢 青橘二的鸡 陳皮本一初司少切曝乾用鹽二两 呉茱萸 洗焙炒 洗 大者 宿 硇砂 桂 ŧ 枚 皮 啊 醋 淬 去

多好四月全書 木香丸 炮製去皮臍半夏一兩湯浸去滑七遍切焙 右為末入郁李仁拌匀煉蜜和九如梧桐子大每服 右為散每服二錢如茶點服覺脾胃寒加附子半兩 十九至十五九食後臨卧生薑湯下 考館啊 积般 集起炒木香雨 陳橘皮 治留飲宿食不消 去白焙 雨湯 郁李仁 卷一百六十六 去皮焙 雨湯浸 甘草之州 大黄果师 檳榔 研 一两

たいりゅんなか 郁李仁九 染九恵す 五九以利為度 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服食前以粥飲 郁李 去做 徒黄 出聖 去皮尖炒一两湯浸 治留飲宿食不消寬利胃膈消進飲食 治腹中留飲宿食不消 漢防已 檳榔 音楽方 **者兩** 做去 啊 廿遂 青橘皮 炒 Ħ 去 閉 汁 六兩去皮臍 徴 黄 两湯 犑 白 焙 土 枳實 泛 漿 水

大黄九 金为正月月十 每服五九温米涉飲下以利為度氣虚者可服 右為末髮糊和九如豌豆大每服十五九至二十九 食後臨臥生薑湯下 人別研二味再同研勺煉蜜和九如菜豆大 分去皮心 治留飲宿食不消 粀 出 油 赤茯苓黑皮 皮 弁 亁 餘銀 藥石 樂只用 點 朴硝 丰 惿 夏 火 煮 分

高良薑九股九 とこうら ころう 悶肋脇虚脹大便秘利不定小兒諸疳黄疸 麝香九 右為木與桃仁研匀煉蜜和九如彈子大每服實者 檳榔三两 高良薑二兩 九虚者半九空心食前温酒下薑湯下亦可 治脾胃氣弱不能飲食肌膚瘦疼心胃膨 桃仁失雙仁炒 治留飲宿食醋心吐沫氣逆脹滿 普楽か 麤一 皮雨 九 大黄

肉豆蔻九 **茶酒下** 右為末酒煮麪糊和九如梧桐子大每服三九食倦 食俊温热水下 右為末醋煮麪糊為九如菜豆大每服七九或十九 肉豆蔻些果果炒 同炒黄色去巴豆巴豆四十粒去皮 升慢火煮乾八月三分與長來東半 治留飲宿食不消 卷一 百六十六 夏同 焙水 巴豆壮枝 ئند 去 出 皮 油 نن ____

治心下堅滿此為留飲宿食宜服此此去 桑耳九息方 12. 12. pt 11. pt | 右捣和以裹膏和丸如麻子大先食服一九不下服 分為三服每於食前温服以利為度 右為散每服以生薑汁半合蜜半合湯一 九病下即止忌野豬肉蘆笋 桑耳 甘遂 我果里夏七次去清 糜留飲宿食不消 巴豆纸果壓去油 普濟方 中盛相和 茳

金分世屋八十 豆魃九 霍香湯 糜痰積聚嘔逆兼風虚勞隂疝方 钡 梧桐子大煎服亦可 石用霜後蒺藜苗子搗十斗汁以文武火煎减半即 以文火煎攪勿停候可九乃止空腹酒下三十丸如 治留飲宿食不消止逆温胃 治留飲宿食腹脇脹滿不喜飲食力 治留飲宿食不消水及級 — 百 ナた r') 颊本

-	 			,		
12.10.01 / 1.1.5 W			門一門		•	
普濟方						
六十二						

普濟方卷一百六十六				
百六十六				卷一百六十六
				_

-. -